


Behandeling van smetten


Hier vind je behandeladviezen voor de verschillende verschijningsvormen van smetten.

Behandeling




Behandeling van smetten

- Ga door of start met de preventieve maatregelen, minimaal 2 keer per dag.
- Breng bij een felrode, glanzende huid minimaal 2 keer per dag Zinkoxidesmeersel FNA dun aan. Of gebruik een barrièreproduct.



Behandeling van smetten met een nattende huid

- Intensiveer één of meerdere preventieve maatregelen, minimaal 3 keer per dag.
- Breng eventueel een antischimmelpreparaat of een combinatiepreparaat tot 2 cm buiten het geïnfecteerde gebied aan. Als je een antischimmelpreparaat gebruikt, breng je daaroverheen een dunne laag Zinkoxidesmeersel FNA aan.
- Breng Zinkoxidesmeersel FNA dun aan. Gebruik een barrièreproduct bij nattende smetplekken alleen ter bescherming van de droge omliggende huid.
- Breng na overleg met de behandelaar lokaal een antischimmelpreparaat aan volgens de bijsluiter. Zet geen onderhoudsdosering in.



Behandeling van smetten met een geïnfecteerde huid

- Raadpleeg een deskundige.
- Pas minimaal 3 keer per dag preventieve maatregelen toe.
- Breng een antischimmelpreparaat of een combinatiepreparaat tot 2 cm buiten het geïnfecteerde gebied aan. Als je een antischimmelpreparaat gebruikt, breng je daaroverheen een dunne laag Zinkoxidesmeersel FNA aan.
- Gebruik bij overmatig exsudaat absorberend, niet-verklevend verband. Gebruik een barrièreproduct bij nattende smetplekken alleen ter bescherming van de droge omliggende huid.

Inschakelen van deskundigen



Arts, verpleegkundig specialist en wondconsulent

- Bij twijfel en bij smetten met een geïnfecteerde huid.
- Als de klachten verergeren of voortduren na de start van de behandeling.



Aandachtspunten bij de behandeling

- Overleg de inzet van een microbiologische kweek met de behandelaar, als er na 14 dagen behandelen geen resultaat is.
- Gebruik corticosteroïden uitsluitend in opdracht van de behandelaar.
- Gebruik Miconazol niet samen met vit K antagonist of acenocoumarol/fenprocoumon.
- Als het gebruik van Miconazol noodzakelijk is, moet dit overlegd worden met de behandelaar of trombosedienst voor extra controle van de INR-waarde.
- Breng een antischimmelpreparaat over en rondom de rode huid aan. Ga na het verdwijnen van de symptomen nog 1 week langer door met behandelen.
- Verwijder eerst eventuele resten Zinkoxidesmeersel FNA met zoete olie, voordat je Zinkoxidesmeersel FNA of een barrièreproduct aanbrengt.

Niet gebruiken

- Poeders, pasta's en zinkzalf, want deze vormen geen barrière.
- Apparatuur om de huid droog te blazen

Evalueren

- Evalueer de behandeling in de volgende gevallen:
- Op dag 3, 7 en 14 na het starten van de behandeling.
 - Als de klachten verergeren tijdens de behandeling. Stel dan opnieuw vast om welke verschijningsvormen van smetten het gaat en pas zo nodig de behandeling aan.
 - Bij twijfel en bij smetten met een geïnfecteerde huid. Evalueer in dit laatste geval samen met een meer deskundige.